

အစားအစာမှတစ်ဆင့် ကူးစက်သောရောဂါများကို အိမ်တွင်ကာကွယ်ခြင်း နိရိုဗိုင်းရပ်စ်

နိရိုဗိုင်းရပ်စ်သည် အလွန်ကူးစက်မြန်သော ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။

ဗိုင်းရပ်စ်အမှုန်အမွှား 18 မှုန်ကပင်လျှင် သင့်ကိုနာမကျန်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ သာမန်လူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် နိရိုဗိုင်းရပ်စ် 5 ကြိမ် ကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်။



၎င်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူ၏ အညစ်အကြေးနှင့်အနံ့ဖတ်များမှတစ်ဆင့် ပြန့်ပွားကူးစက်ပါသည်။

အောက်ပါနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် သင် နိရိုဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရနိုင်ပါသည်-

- ညစ်ညမ်းသောအစာနှင့်ရေ။
- ညစ်ပေသောမျက်နှာပြင်များ။
- ရောဂါပိုးကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်သူနှင့် ထိတွေ့ခြင်း။

နာမကျန်းဖြစ်နေသူတစ်ဦးသည် ရောဂါလက္ခဏာများပျောက်ကင်းသွားသည့်တိုင် နိရိုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်စေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် စင်များ၏မျက်နှာပြင်များ

တွင် ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာအောင် ရှင်သန်နိုင်ပါသည်။

ရောဂါလက္ခဏာများကို 1 ရက်မှ 3 ရက်အထိ ခံစားရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းလက္ခဏာများတွင် ပါဝင်သည်များမှာ-

- ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း။
- အော့အန်ခြင်း။
- ပျို့အန်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
- ဗိုက်အောင့်ခြင်း။

အချို့သောသူများသည် ကိုယ်ပူခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲခြင်းများ ခံစားရပါသည်။



❗ နိရိုဗိုင်းရပ်စ် သည် ကလေးငယ်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ပိုမိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါသည်။



လက္ခဏာများ ပြင်းထန်ပါက သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကို ဆက်သွယ်ပါ။

သင်ဖျားနာနေပါက အိမ်မှာနေပါ။

အခြားသူများအတွက် အစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိသမျှများကိုစောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုခြင်း မပြုပါနှင့်။

ရောဂါလက္ခဏာများပျောက်ကင်းသွားပြီး အနည်းဆုံး 2 ရက်ကြာသည်အထိ စောင့်ဆိုင်းပါ။



မကြာခဏ လက်ဆေးပါ။



အဝတ်အစားများကို ရေနွေးဖြင့်လျှော်ပါ။



မျက်နှာပြင်များကို ပိုးသတ်ဆေးဖြင့် ဆေးကြောပါ။ အညွန့်ပါ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။



စားပြီးနောက် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာသလား။

နာမကျန်းဖြစ်မှုများကို ဒေသန္တရကျန်းမာရေးဌာနထံသို့ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပါ။ အခြားလူများ နာမကျန်းမဖြစ်အောင် သူတို့က လုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။



**Do it Right!
Serve it Safe!**