

Календарь вакцинации ребенка

От рождения до 6 лет

Для
новорожденных

- ☐ Гепатит В
- ☐ РСВ



2 месяца

- ☐ Гепатит В
- ☐ Ротавирус
- ☐ АКДС
- ☐ Нib-вакцина
- ☐ Пневмококковая инфекция
- ☐ Полиомиелит

4 месяца

- ☐ Ротавирус
- ☐ АКДС
- ☐ Нib-вакцина
- ☐ Пневмококковая инфекция
- ☐ Полиомиелит



6 месяцев

- ☐ Гепатит В
- ☐ Ротавирус
- ☐ АКДС
- ☐ Нib-вакцина
- ☐ Пневмококковая инфекция
- ☐ Полиомиелит



12 месяцев

- ☐ Ветряная оспа
- ☐ КПК
- ☐ Нib-вакцина
- ☐ Пневмококковая инфекция
- ☐ Гепатит А

15 месяцев

- ☐ АКДС
- ☐ Нib-вакцина
- ☐ Пневмококковая инфекция

18 месяцев

- ☐ Гепатит А

4-6 лет

В детском саду

- ☐ АКДС
- ☐ Полиомиелит
- ☐ КПК
- ☐ Ветряная оспа



Ежегодно

С 6 месяцев

- ☐ Грипп (2 дозы с интервалом 1 месяц при первой вакцинации от гриппа до 9 лет)
- ☐ COVID-19 (рекомендуется в возрасте 6–23 месяцев; возможна в возрасте от 2 лет)



Некоторые вакцины могут быть комбинированными, чтобы сократить количество инъекций.

Поговорите с врачом, если ваш ребенок:

- Пропустил прием дозы вакцины.
- Плохо себя чувствует, что повышает риск заболевания.
- Будет выезжать за пределы США.

Узнайте больше на сайте
tpchd.org/kidsvax



Tacoma-Pierce County
Health Department
Healthy People in Healthy Communities