

Programa de vacunación para niños

Del nacimiento a los 6 años

Nacimiento

- ☐ Hepatitis B
- ☐ VRS



2 meses

- ☐ Hepatitis B
- ☐ Rotavirus
- ☐ DTaP
- ☐ Hib
- ☐ Neumocócica
- ☐ Polio

4 meses

- ☐ Rotavirus
- ☐ DTaP
- ☐ Hib
- ☐ Neumocócica
- ☐ Polio



6 meses

- ☐ Hepatitis B
- ☐ Rotavirus
- ☐ DTaP
- ☐ Hib
- ☐ Neumocócica
- ☐ Polio



12 meses

- ☐ Varicela
- ☐ SPR (MMR)
- ☐ Hib
- ☐ Neumocócica
- ☐ Hepatitis A

15 meses

- ☐ DTaP
- ☐ Hib
- ☐ Neumocócica

18 meses

- ☐ Hepatitis A

De 4 a 6 años

Kindergarten

- ☐ DTaP
- ☐ Polio
- ☐ SPR (MMR)
- ☐ Varicela



Anualmente

A partir de los 6 meses

- ☐ Antigripal (2 dosis con 1 mes de diferencia al recibir la vacuna contra la gripe por primera vez antes de cumplir 9 años)
- ☐ COVID-19 (se recomienda entre los 6 y 23 meses de edad; puede administrarse a partir de los 2 años de edad)



Algunas vacunas se pueden aplicar como un combo, para reducir la cantidad de pinchazos.

Hable con su proveedor de atención médica si su hijo:

- Omite la dosis de una vacuna.
- Tiene una enfermedad que aumenta su riesgo de infección.
- Viajará fuera de los Estados Unidos.

Obtenga más información en tpchd.org/kidsvax



Tacoma-Pierce County
Health Department
Healthy People in Healthy Communities