

Графік вакцинації дітей

Від народження до 6 років

Народження	☐ Гепатит В ☐ Респіраторно-синцитіальний вірус (RSV)	
2 місяці	☐ Гепатит В ☐ Ротавірусна інфекція ☐ АКДС ☐ Кон'югована вакцина гемофільної палички типу b (Hib) ☐ Пневмококова інфекція ☐ Поліомієліт	
4 місяці	☐ Ротавірусна інфекція ☐ АКДС ☐ Кон'югована вакцина гемофільної палички типу b (Hib) ☐ Пневмококова інфекція ☐ Поліомієліт	
6 місяців	☐ Гепатит В ☐ Ротавірусна інфекція ☐ АКДС ☐ Кон'югована вакцина гемофільної палички типу b (Hib) ☐ Пневмококова інфекція ☐ Поліомієліт	
12 місяців	☐ Вітряна віспа ☐ Вакцина від вірусів кору, епідемічного паротиту і краснухи ☐ Кон'югована вакцина гемофільної палички типу b (Hib) ☐ Пневмококова інфекція ☐ Гепатит А	
15 місяців	☐ АКДС ☐ Кон'югована вакцина гемофільної палички типу b (Hib) ☐ Пневмококова інфекція	
18 місяців	☐ Гепатит А	
4–6 роки	☐ АКДС ☐ Поліомієліт	
Дитячий садок	☐ Вакцина від вірусів кору, епідемічного паротиту і краснухи ☐ Вітряна віспа	
Щорічно	☐ Грип (2 дози з інтервалом в 1 місяць при першому щепленні проти грипу до 9 років) ☐ COVID-19 (рекомендована у віці 6–23 місяців; можлива у віці від 2 років)	
Починаючи з 6 місяців		



Деякі вакцини можна вводити як комбіноване щеплення, щоб зменшити кількість уколів.

Поговоріть зі своїм лікарем, якщо ваша дитина:

- Пропускає дозу вакцини.
- Має стан здоров'я, який підвищує ризик зараження.
- Поїде за межі США.

Дізнайтеся більше на tpchd.org/kidsvax



Tacoma-Pierce County
Health Department
Healthy People in Healthy Communities