

Tratamiento para el trastorno por consumo de opioides


Los Medicamentos para el Trastorno por Consumo de Opioides (MTCO) son medicamentos aprobados por la Federal Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos) que ayudan a reducir o detener el consumo de opioides. Alivian los síntomas de abstinencia y reducen el deseo sin producir el intenso efecto eufórico asociado a los opioides. Nuestras opciones de MTCO incluyen los siguientes medicamentos:

- Metadona
- Suboxone
- Sublocade
- Brixadi
- Vivitrol

¿Funciona?

Según investigaciones, los MTCO reducen el consumo de opioides. Las personas con trastorno por consumo de opioides que reciben MTCO son menos propensas a lo siguiente:

- Morir o sufrir una sobredosis.
- Involucrarse en conductas que las pongan en riesgo de infección por el virus del VIH o la hepatitis C.
- Sufrir una recaída o sobredosis luego de salir de prisión.
- Sufrir una sobredosis tras el encarcelamiento.



Déjanos ayudarte a iniciar tu camino hacia la recuperación.
Brindamos esperanza y apoyo.

Servicios centrados en el paciente

- Medicamentos para el trastorno por consumo de opioides.
- Tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias.
- Consejería grupal e individual.
- Cuidado y seguimiento continuos.
- Educación para la salud.
- Recursos y referencias.
- Narcan (nolaxona).

Cómo conseguir ayuda

Dirígete a las entradas del Departamento de Salud del condado de Tacoma-Pierce sobre Pacific Ave. y solicita servicios o llama al (253) 649-1406. Nuestro objetivo es dispensar los medicamentos el mismo día.

Horarios

Medicamentos

De lunes a viernes de 5 a. m. a 11:30 a. m.
Sábado, 5 a.m. a 8:30 a. m.

Clínica

De lunes a viernes de 5 a. m. a 1:30 p. m.

Servicios de tratamiento

3629 S. D St.
Tacoma, WA 98418

Rev. March 2026

¿Listo para empezar tu camino hacia la recuperación?

Verdades, información y recursos sobre medicamentos para el trastorno por consumo de opioides.





Medicamentos disponibles en los servicios de tratamiento para el trastorno por consumo de opioides

Reducen el deseo compulsivo de consumir opioides y los síntomas de abstinencia.

Metadona

Agonista opioide de acción prolongada.

Líquido, dosis diaria

Suboxone (buprenorfina)

Agonista opioide parcial.

Película bucal, dosis diaria

Sublocade (buprenorfina)

Agonista opioide parcial.

Inyección subcutánea administrada por un proveedor de atención médica, dosis mensual

Brixadi (buprenorfina)

Agonista opioide parcial.

Inyección subcutánea administrada por un proveedor de atención médica, dosis semanal o mensual

Vivitrol (naltrexona)

Bloquea los receptores opioides, evitando que los opioides provoquen sensaciones de placer y ayudando a reducir el deseo. Debes dejar de tomar opioides de 7 a 10 días antes de comenzar a usar Vivitrol.

Inyección intramuscular administrada por un proveedor de atención médica, dosis mensual

Derechos y responsabilidades

Cuando recibes tratamiento para el trastorno por uso de sustancias (TUS), tienes derecho a la proteger tu privacidad, a dar consentimiento informado y a un cuidado de calidad. Tienes derecho a recibir un trato digno y respetuoso y a participar activamente en la elaboración de tu plan de tratamiento.

Por dónde empezar

1

Evaluación

Te reunirás con uno de nuestros consejeros para hablar sobre tus antecedentes de consumo de sustancias. Nuestro proveedor médico te realizará un examen físico.

2

Examen toxicológico

Antes de recibir tu primer medicamento, debes brindar una muestra de orina para que le realicen un examen toxicológico.

3

Medicamentos

Para garantizar tu seguridad, la primera vez te recetaremos una dosis inicial más baja del medicamento. Visitarás nuestra clínica proveedora todas las semanas hasta lograr una dosis estable de medicación.

4

Confidencialidad

Las personas en tratamiento están protegidas por la Normas Federales de Confidencialidad. No podemos decirle a nadie que te encuentras bajo tratamiento, a menos que tú lo autorices.

Aceptamos Medicaid, Medicare y algunos seguros privados.

Mantenimiento

1

Medicación para el hogar

Para empezar, deberás venir a la clínica todos los días. Trabajarás con tu consejero para obtener una medicación para tu hogar con el fin de reducir el tiempo que pasas en la clínica.

2

Seguridad y almacenamiento

Los MTCO pueden dañar gravemente o matar a alguien sin tolerancia al medicamento. Debes almacenar tu medicamento en una caja cerrada con llave.

3

Exámenes toxicológicos

Las muestras rutinarias de orina o fluidos orales muestran el consumo ilícito o inadecuado de drogas. Un resultado positivo no pondrá fin a tu tratamiento, pero podría demorar la entrega de medicamentos adicionales para el hogar.

4

Embarazo

El tratamiento con MTCO es seguro para el embarazo y la lactancia. Es posible que algunos bebés experimenten el síndrome de abstinencia neonatal luego de nacer. Nuestros consejeros te brindarán apoyo durante el embarazo y el posparto.

