

호흡기세포융합바이러스 (Respiratory Syncytial Virus, RSV)

RSV는 감기를 비롯해 그 외 폐렴과 같은 호흡기 감염을 유발합니다.

RSV는 아기, 75세 이상 성인, 면역 체계가 약해진 모든 연령대의 사람들과 특정 만성 질환이 있는 사람들에게 심각한 질병을 일으킬 수 있습니다.

어린이와 성인의 증상

- 콧물.
- 기침.
- 재채기.
- 열.
- 쌉쌉거림.
- 식욕 부진.



아기의 증상

- 청열거림.
- 섭취 곤란.
- 이례적인 피로감.
- 기침 또는 호흡 곤란.



RSV가 확산되는 방식



RSV에 감염된 사람이 기침이나 재채기를 할 때.



바이러스가 있는 표면을 만진 후 얼굴을 만지는 경우.

RSV에 관한 사실

- RSV에 감염된 사람은 증상이 나타나기 전에도 전염성이 있을 수 있습니다.
- 바이러스는 표면에서 몇 시간 동안 살 수 있고, 손에서는 30분 이상 살 수 있습니다.
- RSV는 보통 겨울과 봄에 유행하지만 언제든지 발생할 수 있습니다.


자신과 다른 사람을 보호하세요

- 비누와 따뜻한 물로 자주 손을 씻으세요.
- 기침이나 재채기를 할 때는 휴지나 팔꿈치로 가리세요.
- 지저분한 표면을 닦고 살균하세요.
- 아플 때는 집에 머무르세요.



예방접종은 자신을 보호하는 최고의 방식입니다

- 임신 중 또는 8개월 미만의 아기.
- 특정 고위험 질환을 앓고 있는 유아.
- 특정 고위험 질환을 앓고 있는 50~74세 성인.
- 75세 이상 성인.



RSV 환자 돌보기

RSV에 감염된 사람은 보통 1~2주 안에 회복됩니다. 충분한 휴식과 수분을 섭취하세요.



응급실, 응급 치료실, 의사를 찾아가야 할까요, 아니면 집에서 치료를 받아야 할까요?

다음 질문을 통해 결정할 수 있습니다.

marybridge.org/for-patients-families/where-to-seek-care

자세한 내용을 알아보려면 의사와 상담하거나 tpchd.org/protect를 방문하세요.