

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)

РСВ вызывает простуду и другие респираторные инфекции, такие как пневмония.

РСВ может вызвать серьезные заболевания у младенцев, пожилых людей в возрасте 75 лет и старше и у людей с ослабленной иммунной системой и некоторыми хроническими заболеваниями.

Симптомы у детей и взрослых

- Насморк.
- Кашель.
- Чихание.
- Жар.
- Хрипы.
- Потеря аппетита.



Симптомы у детей

- Раздражительность.
- Плохой аппетит.
- Нетипичная утомляемость.
- Кашель или затрудненное дыхание.



Защитите себя и окружающих

- Часто мойте руки теплой водой с мылом.
- Прикрывайте рот платком или локтем, когда кашляете или чихаете.
- Мойте и дезинфицируйте загрязненные поверхности.
- Оставайтесь дома, если болеете.



Уход за человеком, больным РСВ

Выздоровление от РСВ обычно происходит через 1 или 2 недели. Отдыхайте и пейте много жидкости.



Следует ли обратиться в отделение неотложной помощи, пункт срочной помощи, к врачу или лечиться дома? Для принятия решения вы можете воспользоваться ответами на следующие вопросы:

marybridge.org/for-patients-families/where-to-seek-care

Как распространяется РСВ



Когда человек с РСВ кашляет или чихает.



Когда вы дотрагиваетесь до поверхностей, на которых есть вирусы, а затем – до своего лица.

Факты об РСВ

- Человек с РСВ может быть заразным еще до появления симптомов.
- Вирусы могут жить на поверхностях в течение нескольких часов, а на руках – более 30 минут.
- РСВ обычно циркулирует зимой и весной, но может возникнуть в любое время.

Вакцинация обеспечивает наилучшую защиту.

- Во время беременности или у детей до 8 месяцев.
- Дети с некоторыми заболеваниями, представляющими высокий риск.
- Взрослые в возрасте 50-74 лет с некоторыми заболеваниями, представляющими высокий риск.
- Лица в возрасте от 75 лет.



Дополнительную информацию вы можете получить у врача или на сайте tpchd.org/protect.