

접촉자 A: 코로나19 검사 양성


증상:

다음 때까지 격리:

- 증상이 시작된 때부터 5일간 격리합니다.
그리고
- 발열없이(타이레놀과 같은 열을 내리기 위한 약물 복용없이) 24시간이 지났습니다.
그리고
- 증상이 개선되었습니다.

증상이 없는 경우:

5일간 격리하십시오. 0일은 양성 판정을 받은 날입니다.
증상을 확인하십시오.




권장 사항: 10일간 다른 사람들이 주변에 있는 경우 자신에게 꼭 맞는 마스크를 착용하십시오.

접촉자 B: 동일 접촉자 가족

사람 A에 최초 노출된 후 3~5일이 지난 후에 테스트를 시작합니다. 최종 노출 후 3~5일 후에 테스트를 반복 실시하십시오.

해당 기간 및 최종 노출 후 10일간:

- 마스크를 착용하십시오.
- 중증 질환에 걸릴 확률이 높은 사람들로의 접근을 피하십시오.
- 코로나19 증상에 주의를 기울이십시오.




접촉자 C: 밀접 접촉자

사람 A에 최종적으로 노출된 후 3-5일부터 테스트를 시작하십시오. 최대한 24-48시간 주기로 테스트를 반복하여 총 3회 실시하십시오.

최종 노출 후 10일간:

- 마스크를 착용하십시오.
- 중증 질환에 걸릴 확률이 높은 사람들로의 접근을 피하십시오.
- 코로나19 증상에 주의를 기울이십시오.



접촉자 D: 접촉자 B 또는 C와 밀접 접촉이 있는 사람

사람 D는 다음과 같은 경우가 아니면 아무런 조치를 취하지 않아도 됩니다.

- 피시험인 B또는 C의 테스트가 양성으로 나왔습니다.
및
- 노출은 사람 B 또는 C가 증상 없이 양성 테스트 반응을 보이기 전 최대 48시간이었습니다.
또는
- 노출은 사람 B 또는 C가 증상이 있고 양성 판정을 받기 전 최대 48시간이었습니다.



부모 및 보호자: 자녀가 코로나19 양성 판정을 받은 경우 즉시 학교나 보육 센터에 해당 사실을 알려십시오. 이로써 바이러스 확산을 저지하고 어린이들과 직원들을 보호하며 시설을 계속 운영할 수 있게됩니다.

자가 테스트를 통해 귀하가 양성 반응을 보인 경우 워싱턴 주 COVID-19 핫라인 1-800-525-0127로 전화하십시오. 스페인어는 # 또는 7번을 누르십시오. 언어 지원을 이용할 수 있습니다.

코로나19 양성 판정을 받은 경우 5일 동안 격리하십시오.