


ជំងឺរបេង អ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹង

ជំងឺរបេង(TB)គឺជាការបង្ករោគដោយបាក់តេរី។



មនុស្សភាគច្រើនដែលមានជំងឺរបេង គឺមានរោគនេះនៅក្នុងសួតរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែវាអាចឆ្លងទៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយ។



អង់ទីប៊ីយ៉ូទិចអាចព្យាបាលជំងឺរបេងបាន។

ជំងឺរបេងមិនងាយចម្លងនោះទេ។

ទាល់តែអ្នកចំណាយពេលច្រើននៅក្បែរមនុស្សដែលកំពុងកើតជំងឺរបេង នោះទើបឆ្លង។



ជំងឺរបេងមិនងាយឆ្លងទេនៅខាងក្រៅអគារ ព្រោះខ្យល់បក់ទៅមក ហើយពន្លឺព្រះអាទិត្យសម្លាប់បាក់តេរីនោះ។

ជំងឺរបេងមានពីរដំណាក់កាល។



មនុស្សដែលមានរោគរបេងដំណាក់កាលសម្ងំ៖

- មានផ្ទុកបាក់តេរីដែលបង្កជំងឺរបេង ប៉ុន្តែមិនទាន់ឈឺ។
- មិនអាចចម្លងជំងឺរបេង។
- គួរតែទទួលការព្យាបាលមុនពេលវិវឌ្ឍទៅជាជំងឺរបេងសកម្ម។



អ្នកដែលមានជំងឺរបេងសកម្ម៖


- មានផ្ទុកបាក់តេរីដែលបង្កជំងឺរបេង ហើយឈឺ។
- អាចចម្លងជំងឺរបេងតាមរយៈការក្អកកណ្តាស់ សើច ស្រែក ឬច្រៀង។
- ត្រូវតែទទួលការព្យាបាល ដើម្បីចៀសវាងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំង និងស្លាប់។

ជំងឺរបេងមិនឆ្លងនោះទេ នៅពេលដែលមនុស្ស៖



ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ ប្រើប្រាស់បាន ឱប ថើប ឬ រួមគ្នា។ ស្លាបព្រាសម្រួមគ្នា។ រួមភេទ។

ជំងឺរបេងមិនមែនជាជំងឺដែលទូទៅនោះទេ នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។



ជំងឺរបេងប្រហែល 30 ករណី កើតមាននៅក្នុងខោនធី Pierce ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

រោគសញ្ញានៃជំងឺរបេងសកម្ម



- ក្អកចំនួន 3 សប្តាហ៍ ឬយូរជាងនេះ។
- គ្រុនក្តៅ
- អស់កម្លាំង ឬស្លេច
- បែកញើសនៅពេលយប់
- ស្រកទម្ងន់
- ក្អក ធ្លាក់ឈាម

មនុស្សដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ប្រឈមនឹងជំងឺរបេង



- រស់នៅជាមួយមនុស្សដែលកំពុងកើតជំងឺរបេងសកម្ម។
- ធ្វើដំណើរទៅកាន់ឬកើតនៅកន្លែងដែលជំងឺរបេងគឺជាជំងឺដែលទូទៅ។
- មានបញ្ហាសុខភាព។