

Bệnh Lao

Những gì bạn cần biết

Bệnh lao (TB) là một bệnh nhiễm khuẩn.



Hầu như mọi người thường mắc bệnh lao phổi. Nhưng vi khuẩn lao có thể lây nhiễm sang bất kỳ bộ phận nào trong cơ thể.



Bệnh lao có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Bệnh lao không dễ lây lan.

Quý vị phải tiếp xúc gần với người mắc bệnh lao hoạt tính trong một thời gian dài thì mới có thể bị lây nhiễm.



Bệnh lao không dễ lây lan ngoài trời do không khí làm phân tán vi khuẩn và ánh nắng mặt trời tiêu diệt chúng.

Bệnh lao có 2 giai đoạn.



Giai đoạn nhiễm lao tiềm ẩn:

- Đã nhiễm vi khuẩn lao nhưng chưa phát bệnh.
- Không thể phát tán vi khuẩn lao.
- Nên được điều trị trước khi bệnh chuyển biến thành lao hoạt tính.



Giai đoạn nhiễm lao hoạt tính:

- Đã nhiễm vi khuẩn lao và phát bệnh.
- Có thể phát tán vi khuẩn lao khi ho, hắt hơi, cười, hò hét hoặc ca hát.
- Cần được điều trị để tránh bệnh chuyển biến xấu và gây tử vong.

Bệnh lao không lây lan khi mọi người:



Dùng chung quần áo.




Dùng chung dụng cụ ăn uống.



Ôm, hôn hoặc quan hệ tình dục.

Bệnh lao thường hiếm gặp ở tại Mỹ.



Mỗi năm, Hạt Pierce có khoảng 30 ca bệnh lao.

Triệu chứng của bệnh lao hoạt tính:



- Ho dai dẳng từ 3 tuần trở lên.

- Sốt cao.
- Mệt mỏi.
- Đổ mồ hôi đêm.

- Sụt cân.
- Ho ra máu.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh lao:



Sống chung với người mắc bệnh lao hoạt tính.



Đi du lịch đến hoặc sinh ra ở nơi thường xảy ra bệnh lao.



Có vấn đề về sức khỏe.

Tìm hiểu thêm thông tin tại tpchd.org/tb.