

# Cuándo debe quedarse su hijo (a) en casa

Estimado padre, madre o tutor:

Su hijo (a) debe quedarse en casa y faltar a la escuela si:

- Está muy enfermo (a) para participar en actividades escolares normales.
- Necesita un nivel de atención u observación que no se puede realizar en la escuela.
- Crea un entorno insalubre o inseguro para los demás.

Su hijo (a) debe quedarse en casa si tiene uno de las siguientes afecciones o enfermedades:

<b>Varicela</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que las ampollas tengan costras y no se formen nuevas.
<b>Diarrea</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que se contenga la diarrea y la frecuencia de las deposiciones vuelva a la normalidad. Su hijo (a) debe quedarse en casa si tiene heces con sangre o con moco.
<b>Fiebre</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que su temperatura sea menor de 100.4°F (sin tomar medicamentos antipiréticos) y no tenga cambios de conducta, dolor de garganta, erupciones, vómitos, diarrea, dolor de oído, irritabilidad ni confusión.
<b>Gripe, COVID-19, VSR</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que los síntomas hayan mejorado y que no haya tenido fiebre durante 24 horas (sin tomar medicamentos).
<b>Sarampión</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa durante 4 días después del inicio de las erupciones.
<b>Paperas</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa durante 5 días después del inicio de la hinchazón.
<b>Tiña</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que haya iniciado el tratamiento.
<b>Sarna</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que haya iniciado el tratamiento.
<b>Fiebre escarlata</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que haya tomado antibióticos durante 24 horas y ya no tenga fiebre.
<b>Herpes zóster (culebrilla)</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que las erupciones puedan cubrirse o las lesiones tengan costras.
<b>Infección en la piel</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa si tiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Heridas abiertas supurantes que no pueda cubrir con un vendaje a prueba de agua.</li> <li>• Llagas en la boca con babeo.</li> </ul> Puede volver a la escuela después de que los síntomas hayan desaparecido o el proveedor de atención médica lo evalúe y le proporcione tratamiento.
<b>Faringitis estreptocócica</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que haya tomado antibióticos durante 24 horas y ya no tenga fiebre.
<b>Vómitos</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que no haya tenido vómitos durante 24 horas y pueda participar en actividades normales.
<b>Tos Ferina</b>	Su hijo (a) debe quedarse en casa hasta que haya tomado antibióticos durante 5 días completos.
<b>Otras enfermedades contagiosas</b>	Verifique en la escuela de su hijo (a) o con su proveedor de atención primaria.

Estas afecciones **no requieren** que su hijo (a) se quede en casa (a menos que esté demasiado enfermo para participar en las actividades normales):

- Bronquitis.
- Resfriado (sin fiebre).
- Citomegalovirus (CMV).
- Infección de oído.
- Quinta enfermedad.
- Enfermedad de las manos, los pies y la boca.
- Molusco contagioso.
- Mononucleosis.
- Infección del ojo.
- Oxiuros.
- Neumonía.
- Verrugas.

El Departamento de Salud, los proveedores de atención médica o las escuelas pueden hacer excepciones a estos requisitos según el caso.