

មេរោគវីរុសផ្លូវដង្ហើម (Respiratory Syncytial Virus, RSV)

វីរុស RSV បង្កឱ្យកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើមផ្សេងទៀត ដូចជាជំងឺរលាកសួត ជាដើម។

វីរុស RSV អាចបង្កឱ្យកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទារក មនុស្សពេញវ័យ ចាប់ពីអាយុ 75 ឆ្នាំឡើងទៅ និងមនុស្សគ្រប់វ័យដែលមានប្រព័ន្ធ ការពាររាងកាយទន់ខ្សោយ និងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួន។

រោគសញ្ញាចំពោះកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ

- ហៀរសំបោរ
- ក្អក
- កណ្តាស់
- គ្រុនក្តៅ
- ដកដង្ហើមតឹងដូចកើតហ៊ឺត
- ចំណង់អាហារតិច



រោគសញ្ញាចំពោះទារក

- មានអារម្មណ៍ម្តងម៉ោង
- មិនសូវបៅ
- អស់កម្លាំងខុសពីធម្មតា
- ក្អកឬពិបាកដកដង្ហើម



សូមការពារខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដទៃ

- លាងដៃរបស់អ្នកញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកក្ដៅខណ្ឌៗ។
- គ្របមាត់នៅពេលក្អកនិងកណ្តាស់ដោយប្រើក្រដាសជូតមាត់ឬកែងដៃ។
- សម្អាតនិងអនាម័យតាមលើផ្ទៃកន្លែង
- ស្នាក់នៅផ្ទះពេលអ្នកឈឺ



របៀបដែលមេរោគវីរុស RSV រាលដាល



នៅពេលមនុស្សដែលមានផ្ទុកវីរុស RSV ក្អក ឬកណ្តាស់



នៅពេលអ្នកប៉ះផ្ទៃដែលមានមេរោគវីរុសរួចប៉ះមុខរបស់អ្នក

ការពិតអំពីមេរោគវីរុស RSV

- មនុស្សដែលមានផ្ទុកមេរោគវីរុស RSV អាចឆ្លងមុនពេលចេញរោគសញ្ញា
- មេរោគវីរុសអាចរស់នៅលើផ្ទៃបានច្រើនម៉ោងនិងនៅលើដៃជាង 30 នាទី
- ជាធម្មតា មេរោគវីរុស RSV រីករាលដាលក្នុងរដូវរងានិងរដូវផ្ការីក ប៉ុន្តែអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលា។

ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ ផ្តល់ការការពារដ៏ល្អបំផុត

- អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ឬសម្រាប់ទារកអាយុក្រោម 8 ខែ
- កុមារដែលទើបចេះដើរតេតះដែលមានហានិភ័យខ្ពស់
- មនុស្សពេញវ័យអាយុពី 50-74 ឆ្នាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់
- មនុស្សពេញវ័យចាប់ពីអាយុ 75 ឆ្នាំឡើងទៅ



ការថែទាំមនុស្សដែលមានផ្ទុកវីរុស RSV

មនុស្សដែលមានមេរោគ RSV ជាធម្មតាជាសះស្បើយឡើងវិញក្នុងរយៈពេល 1 ឬ 2 សប្តាហ៍។ សូមសម្រាកនិងទទួលបានទឹកឱ្យបានច្រើន។



តើអ្នកគួរទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅមន្ទីរមើលជំងឺបន្ទាន់ទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ឬមើលថែខ្លួននៅផ្ទះដែរឬទេ? អ្នកអាចប្រើសំណួរទាំងនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត៖

marybridge.org/for-patients-families/where-to-seek-care

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ឬចូលទៅគេហទំព័រ tpchd.org/protect។