

Респіраторно-синцитіальний вірус (RSV)

RSV викликає застуду та інші респіраторні інфекції, наприклад пневмонію.

RSV може викликати важкі захворювання у немовлят, дорослих від 75 років, а також людей будь-якого віку з ослабленою імунною системою та певними хронічними захворюваннями.

Симптоми у дітей і дорослих

- Нежить.
- Кашель.
- Чхання.
- Лихоманка.
- Хрипи.
- Зниження апетиту.



Симптоми у немовлят

- Дратівливість.
- Погане годування.
- Незвична втома.
- Кашель або проблеми з диханням.



Захистіть себе та інших

- Часто мийте руки з милом і теплою водою.
- Прикривайте рота хусткою чи ліктем, коли чхаєте або кашляєте.
- Очистіть і продезінфікуйте забруднені поверхні.
- Залишайтеся вдома, якщо захворіли.



Догляд за людиною з RSV

Людина з RSV зазвичай одужує за 1–2 тижні. Потрібно багато відпочивати та пити рідину.



Чи слід звертатися до пункту швидкої допомоги, до відділення невідкладної допомоги, до медичного закладу чи лікуватися вдома? Використовуйте ці запитання для прийняття рішення:

marybridge.org/for-patients-families/where-to-seek-care

Як поширюється RSV



Коли людина з RSV кашляє або чхає.



Коли ви торкаєтесь поверхні з вірусами, а потім торкаєтесь свого обличчя.

Факти про RSV

- Людина з RSV може бути заразною до появи симптомів.
- Віруси можуть жити на поверхнях годинами, а на руках — понад 30 хвилин.
- RSV зазвичай циркулює взимку та навесні, але може виникнути будь-коли.

Імунізація забезпечує найкращий захист

- Під час вагітності або для немовлят до 8 місяців.
- Малюків із певними високоризикованими станами.
- Дорослих 50–74 років із певними високоризикованими станами.
- Дорослих від 75 років.



Щоб дізнатися більше, зверніться до свого лікаря або відвідайте tpchd.org/protect.