

Lịch Tiêm Vắc-xin cho Trẻ

Từ sơ sinh đến 6 tuổi

Sơ sinh

- ☐ Viêm gan B
- ☐ RSV


2 tháng tuổi

- ☐ Viêm gan B
- ☐ Virus Rota
- ☐ DTaP
- ☐ Hib
- ☐ Phế cầu khuẩn
- ☐ Bại liệt

4 tháng tuổi

- ☐ Virus Rota
- ☐ DTaP
- ☐ Hib
- ☐ Phế cầu khuẩn
- ☐ Bại liệt


6 tháng tuổi

- ☐ Viêm gan B
- ☐ Virus Rota
- ☐ DTaP
- ☐ Hib
- ☐ Phế cầu khuẩn
- ☐ Bại liệt


12 tháng tuổi

- ☐ Thủy đậu
- ☐ MMR
- ☐ Hib
- ☐ Phế cầu khuẩn
- ☐ Viêm gan A

15 tháng tuổi

- ☐ DTaP
- ☐ Hib
- ☐ Phế cầu khuẩn

18 tháng tuổi

- ☐ Viêm gan A

4–6 tuổi
Mẫu giáo

- ☐ DTaP
- ☐ Bại liệt
- ☐ MMR
- ☐ Thủy đậu


Hàng năm
Bắt đầu từ 6 tháng tuổi

- ☐ Cúm (2 liều cách nhau 1 tháng khi tiêm phòng cúm lần đầu trước 9 tuổi)
- ☐ COVID-19 (nên tiêm khi trẻ từ 6–23 tháng tuổi, có thể tiêm khi trẻ từ 2 tuổi trở lên)



Một số loại vắc-xin có thể được tiêm kết hợp nhiều mũi để giảm số lần tiêm.

Trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu con quý vị:

- Bỏ lỡ một liều vắc-xin.
- Có bệnh lý làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.
- Sẽ đi ra khỏi phạm vi Hoa Kỳ.

Learn more at tpchd.org/kidsvax



Tacoma-Pierce County
Health Department
Healthy People in Healthy Communities